

Fiche à l'attention des patients

Comprimé buccogingival
muco-adhésif



Document d'information relatif aux modalités d'utilisation
du médicament et aux précautions à prendre pour réduire le
risque potentiel d'adhésion du comprimé sur l'œsophage en cas
d'ingestion accidentelle.

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

MAPR-Virpax-2023/03

Version de décembre 2023

The Zambon logo is located in the bottom right corner of a decorative horizontal bar. It consists of the word 'Zambon' in a white, sans-serif font, with a stylized 'Z'.

Virpax

Aciclovir



**Comprimé buccogingival
muco-adhésif**

QUAND APPLIQUER VIRPAX 50 mg ?

Virpax 50 mg doit être appliqué dès l'apparition des premiers symptômes avant-coureurs (brûlures, picotements, démangeaisons) ou signes (rougeur, gonflement) d'herpès labial (bouton de fièvre).

COMMENT APPLIQUER VIRPAX 50 mg ?

Si la bouche est sèche, il est recommandé de boire de l'eau afin d'humidifier votre gencive **avant d'appliquer le comprimé**.



Repérer la fosse canine avec le doigt (juste au-dessus d'une incisive supérieure).




Sortir le comprimé de son emballage.



Placer le comprimé sur votre doigt qui doit être bien sec.



Appliquer le comprimé dans la fosse canine, contre la gencive supérieure, juste au-dessus d'une incisive (fosse canine), comme l'indique le schéma.



Maintenir le comprimé pendant 30 secondes avec une légère pression du doigt sur l'extérieur de la lèvre supérieure pour qu'il adhère bien.

Virpax 50 mg peut aussi être **appliqué à l'intérieur** de la lèvre s'il colle à cet endroit plutôt que contre la gencive. Pour des raisons de confort, placez la face arrondie contre la gencive supérieure, mais les deux côtés du comprimé peuvent être indifféremment appliqués.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- **Avant d'appliquer le comprimé**, si vous avez la bouche sèche : buvez un verre d'eau.
- **Positionnez le comprimé** immédiatement après l'avoir sorti de l'emballage.
- **Si le comprimé ne colle pas** : repositionnez-le et appuyez légèrement sur la lèvre.
- **Une fois le comprimé en place**, vous pouvez prendre vos repas et boire comme à votre habitude.

	Si vous avalez accidentellement votre comprimé.	Si votre comprimé n'adhère plus ou tombe.
 <p>appliquer Avant les 6 premières heures suivant l'application</p>	Buvez un verre d'eau et appliquez-en un nouveau. Ne le remplacez qu'une seule fois.	Placez immédiatement le même comprimé, ou un nouveau comprimé si l'ancien n'adhère plus. Ne le remplacez qu'une seule fois.
 <p>appliquer Après les 6 premières heures suivant l'application</p>	Buvez un verre d'eau. N'appliquez pas de nouveau comprimé.	N'appliquez pas de nouveau comprimé.

- Le comprimé ne doit pas être sucé, mâché ou avalé.
- À éviter :



Toucher ou appuyer sur le comprimé déjà en place



Mâcher un chewing-gum



Brosser les dents pendant la journée du traitement

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable ou en cas d'erreur médicamenteuse, rappelez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmière. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr. Des informations complètes sur le médicament sont présentes dans la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>. Lisez attentivement la notice contenue dans votre boîte de médicament avant utilisation.

Titulaire de l'AMM : Vectane Pharma - 230 Bureaux de la Collière - 92213 Saint-Cloud - FRANCE.
Exploitant : ZAMBON France S.A. - 15 RUE RENE JACQUES - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE.